

Математический анализ

Модуль 1. Элементарные функции и пределы

Лекция 1.5

Аннотация

Сравнение функций. О-большое и о-малое. Эквивалентные функции и их применение к вычислению предела. Таблица эквивалентных бесконечно малых функций.

1 Сравнение функций


Пусть $\mathring{U}(a)$ - некоторая проколотая окрестность точки a .

Определение

Функция $f(x)$ называется **ограниченной по сравнению** с функцией $g(x)$ в $\mathring{U}(a)$, если $\exists c > 0 \forall x \in \mathring{U}(a): |f(x)| \leq c \cdot |g(x)|$.

Обозначение: $f(x) = O(g(x)), x \rightarrow a$. Произношение: f - это “О”-большое от g .

Пример:



Определение

Если функции $f(x)$ и $g(x)$ таковы, что $f(x) = O(g(x))$ и $g(x) = O(f(x))$ при $x \rightarrow a$, то они называются **функциями одного порядка** при $x \rightarrow a$.

Обозначение: $f(x) \asymp g(x), x \rightarrow a$.

Определение

Пусть $f(x) \neq 0$ и $g(x) \neq 0 \forall x \in \overset{\circ}{U}(a)$. Тогда функции $f(x)$ и $g(x)$ называются **эквивалентными** при $x \rightarrow a$, если

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

Обозначение: $f(x) \sim g(x), x \rightarrow a$.

Свойства эквивалентных функций

- 1) если $f \sim g, x \rightarrow a$, то $g \sim f, x \rightarrow a$
- 2) если $f \sim g, g \sim h, x \rightarrow a$, то $f \sim h, x \rightarrow a$

Определение

Пусть $f(x) \neq 0 \forall x \in \overset{\circ}{U}(a)$. Тогда функция $g(x)$ называется **бесконечно малой по сравнению** с функцией $f(x)$ при $x \rightarrow a$, если


$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)} = 0.$$

Обозначение: $g(x) = o(f(x)), x \rightarrow a$. Произношение: g - это “о”-малое от f при $x \rightarrow a$.

Определение

Пусть $f(x)$ и $g(x)$ - бесконечно малые функции при $x \rightarrow a$ и $g(x) = o(f(x)), x \rightarrow a$. Тогда говорят, что $g(x)$ является **бесконечно малой более высокого порядка**, чем $f(x)$.

Пример:



Здесь обе функции f и g стремятся к нулю при $x \rightarrow +\infty$, только функция g убывает быстрее, чем функция f .

Определение

Пусть $f(x)$ и $g(x)$ - бесконечно малые функции при $x \rightarrow a$ и $g(x) = o(f(x)), x \rightarrow a$. Тогда функция $g(x)$ называется **бесконечно малой порядка r относительно** функции $f(x)$, если существует не равный нулю конечный предел

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{(f(x))^r}.$$

Свойства “о”-малое

- 1) $o(f) + o(f) = o(f)$
- 2) $o(cf) = o(f), c \neq 0$
- 3) $c \cdot o(f) = o(f), c \neq 0$
- 4) $o(o(f)) = o(f)$
- 5) $o(f + o(f)) = o(f)$
- 6) $o(f^n) \cdot o(f^m) = o(f^{n+m})$
- 7) $(o(f))^n = o(f^n)$

*Теорема (о связи эквивалентности и “о”-малое)**

Для того чтобы функции $f(x)$ и $g(x)$ были эквивалентны при $x \rightarrow a$, необходимо и достаточно, чтобы при $x \rightarrow a$ выполнялось условие

$$f(x) = g(x) + o(g(x)).$$

Доказательство

1) необходимость

Дано: $f(x) \sim g(x), x \rightarrow a$.

Доказать: $f(x) = g(x) + o(g(x)), x \rightarrow a$.

Введем функцию $\varphi(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$. Так как $f(x) \sim g(x), x \rightarrow a$, то

$$\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

$$f(x) - g(x) = \varphi(x)g(x) - g(x) = (\varphi(x) - 1)g(x).$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - g(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(\varphi(x) - 1)g(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} (\varphi(x) - 1) = 1 - 1 = 0.$$

$$\Rightarrow f(x) - g(x) = o(g(x)), x \rightarrow a.$$

$$\Rightarrow f(x) = g(x) + o(g(x)), x \rightarrow a.$$

2) достаточность

Дано: $f(x) = g(x) + o(g(x)), x \rightarrow a$.

Доказать: $f(x) \sim g(x), x \rightarrow a$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) + o(g(x))}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \left(1 + \frac{o(g(x))}{g(x)}\right) = 1 + \lim_{x \rightarrow a} \frac{o(g(x))}{g(x)} = \\ &= 1 + 0 = 1. \Rightarrow f(x) \sim g(x), x \rightarrow a. \blacksquare \end{aligned}$$

Определение

Если функция $f(x)$ представима в виде $f(x) = g(x) + o(g(x)), x \rightarrow a$, то функция $g(x)$ называется **главной частью** функции $f(x)$.

*Теорема (о пределах эквивалентных функций)**

Пусть $f(x) \sim f_1(x)$ и $g(x) \sim g_1(x)$ при $x \rightarrow a$. Тогда если существует

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f_1(x)}{g_1(x)},$$

то существует и

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)},$$

причем

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f_1(x)}{g_1(x)}.$$

Доказательство

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f}{g} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f \cdot f_1 \cdot g_1}{f_1 \cdot g_1 \cdot g} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f}{f_1} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{f_1}{g_1} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{g_1}{g} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f_1}{g_1}. \blacksquare$$

Для применения этой теоремы необходимо знать таблицу эквивалентных функций.

Таблица эквивалентных бесконечно малых функций

- 1) $\sin x \sim x, x \rightarrow 0$
- 2) $\operatorname{tg} x \sim x, x \rightarrow 0$
- 3) $\arcsin x \sim x, x \rightarrow 0$
- 4) $\operatorname{arctg} x \sim x, x \rightarrow 0$
- 5) $1 - \cos x \sim x^2/2, x \rightarrow 0$
- 6) $\ln(1 + x) \sim x, x \rightarrow 0$
- 7) $e^x - 1 \sim x, x \rightarrow 0$
- 8) $a^x - 1 \sim x \ln a, x \rightarrow 0$
- 9) $(1 + x)^m - 1 \sim mx, x \rightarrow 0$

Используя теорему о замене переменной можно показать, что в данной таблице отношение эквивалентности сохранится, если переменную x заменить на какую-либо функцию u .

Примеры:

1) $\sin u \sim u, u \rightarrow 0$

2) $\operatorname{tg} u \sim u, u \rightarrow 0$

3) $e^u - 1 \sim u, u \rightarrow 0$

Здесь $u = u(x)$ - некоторая функция, которая должна стремиться к нулю: $u \rightarrow 0$.